

БиоТокс

Сорбент микотоксинов

БиоТокс

Сорбент микотоксинов для применения в комбикормах

- + Связывает афлатоксины, охратоксины и фузариевые токсины
- + Предотвращает микотоксикозы
- + Сохраняет высокую продуктивность животных и птицы в периоды заражения кормов микотоксинами

Процент проколов у свиноматок после первого опороса в свиноводческом племенном хозяйстве



Микотоксины в комбикормах

ЗЕА, 005 - 0,16 мкг/кг
ДОН, 0,5 - 1 мкг/кг


БиоТокс применяется в дозировке 3 кг/т комбикорма

■ % проколов

Применение БиоТокс в племенной бройлерной птицефабрике
Микотоксины в комбикормах: АЗФА, ЗЕА, Т-2

	Контроль (группа)	С применением БиоТокс (группа до 20 недель)
Половые органы, шт	0,40	0,40
Качество оперения, %	100	100
Восприимчивость, %	100	100
% выживаемости	99,2%	99,7%
Средняя масса цыплят на вырост	100	100,7

Применение БиоТокс на молочных коровах
2 группы по 100 голов в каждой
Средства микотоксины в дозировке АЗФА-Б1



 **Biochem**

Безопасный Корм для Здорового Питания

Группа компаний Биохем (генеральный представитель Biochem GmbH, Германия)
г. Москва, ул. Производственная, д. 6, офис 240, тел./факс: (495) 781-23-89, тел.: (495) 968-04-54
web: www.biochem.net e-mail: russia@biochem.net